

ABSTRACT: En una gran preocupación porque el consumo de drogas deteriora la salud de las personas, la Universidad Santo Tomás con el profesor Pablo Vallejo Medina, en conjunto con la Universidad de Granada – España con el profesor Juan Carlos Sierra Freire, realizaron una investigación en cuanto al consumo de las drogas obteniendo como resultado el siguiente: el consumo de drogas afecta el funcionamiento sexual de los varones, incluso después de años de abstinencia.

El consumo de drogas empeora el funcionamiento sexual de los varones, incluso después de años de abstinencia



18/12/2012

- *Un artículo publicado en el Journal of Sexual Medicine de EEUU revela que el alcohol es la droga que más afecta a la excitación (capacidad eréctil).*
- *Además, los investigadores observaron que el funcionamiento sexual de los varones no mejora por el mero hecho de dejar de consumir la sustancia.*
- *En este estudio han participado 905 varones, de los que 550 estaban diagnosticados de dependencia de alcohol, cocaína, cocaína y alcohol, heroína, marihuana y speedball (heroína+cocaína).*

Investigadores de la Universidad de Granada y la [Universidad Santo Tomás de Colombia](#) han descubierto que el consumo de drogas empeora el funcionamiento sexual de los varones, incluso después de años de abstinencia, contradiciendo otros estudios previos que aseguraban que, a las tres semanas de abandonar el consumo, el funcionamiento sexual volvería espontáneamente a su nivel normal.

Se trata de un artículo publicado en la prestigiosa revista estadounidense *Journal of Sexual Medicine*, la revista oficial de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, por los científicos **Pablo Vallejo Medina**, profesor de la Universidad Santo Tomás de Colombia, y **Juan Carlos Sierra Freire**, de la Universidad de Granada.

En esta investigación se evaluó el funcionamiento sexual de un total de 905 varones, de los que 550 estaban diagnosticados de dependencia de siete sustancias de consumo preferente: alcohol, cocaína, cocaína y alcohol, heroína, marihuana y speedball (heroína+cocaína). Los 356 varones restantes, que no consumían sustancias, actuaron como grupo control.

Evaluación de cuatro áreas

Los investigadores estudiaron y evaluaron cuatro áreas del funcionamiento sexual: deseo sexual, satisfacción sexual, excitación sexual y orgasmo. Su trabajo demostró que todas ellas se encontraban significativa y moderadamente más perjudicadas en el grupo consumidor de drogas que en el de aquellos sujetos que no consumían.

Además, comprobaron cómo las distintas sustancias afectan de forma diferencial a diferentes facetas de la sexualidad. Por ejemplo, el placer sexual se observa más perjudicado en los consumidores de speedball, seguido de cerca por los consumidores de cocaína. El deseo sexual es el área del funcionamiento sexual menos perjudicada, y los consumidores de cocaína tienen un deseo sexual muy elevado en fases agudas de consumo.

http://biotic.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-cientificas/2012/12/18/el-consumo-de-drogas-empeora-el-funcionamiento-sexual-de-los-varones-incluso-despues-de-años-de-abstinencia